

Bensan iPrep

**Povidone iodine-based antiseptic
solution for professional
and hospital use only.**



Patient preoperative skin preparation:

For preparation of skin prior to surgery.
Helps reduce bacteria on the skin that can potentially cause infection.

Spectrum:

Topical bactericide

Ingredients:

10% Povidone Iodine Solution (1% active povidone iodine).

Inactive Ingredients:

Citric Acid, Potassium Hydroxide, Polyethylene Glycol, Acqua

Warnings:

Keep out of reach of children

For external Use Only.

Do not take by mouth.

Do not use:

- in the eyes
- if you are allergic to povidone-iodine or any other ingredients in this preparation

Precautions:

- Causes serious eye irritation
- Keep container tightly closed
- **IF SWALLOWED: DO NOT INDUCE VOMITING.** Promptly give a glass of water to drink and call a physician or poison center immediately.
- **IF IN EYES:** Rinse cautiously for several minutes. Remove contact lenses. Continue rinsing.



Directions

- Clean area
- Apply solution to surgical site following povidone iodine scrub application
- Starting at the surgical site moving outward in concentric circles
- Allow a minimum of 2 minutes drying time before draping
- Remove all soiled under-drapes
- Do not allow solution to pool

Other information

- Keep Cool. Protect from Sunlight.
- Store between 20-25°C (68-77°F). Avoid excessive heat over 40°C.
- For additional information, see Safety Data Sheet (SDS)



Safecare Medical Industries
KIZAD KHIA 8-18
PO. Box 133685, Abu Dhabi
United Arab Emirates

Product Made in the United Arab Emirates

Reorder Number: PVP1001

Content: 500 ml

For product or technical information, contact Safecare Medical at +971 2 506 7333 or visit our website at www.bensano.com.

Bensan iPrep

محلول مطهر يحتوي على اليود
من بوفيدون للاستخدام المهني
والمستشفى فقط

تحضير جلد المريض قبل الجراحة

- لتحضير الجلد قبل الجراحة
- يساعد في تقليل البكتيريا الموجودة على الجلد والتي يمكن أن تسبب العدوى

نطاق

مبيد الجراثيم الموضعي

المكونات

1% Povidone Iodine Solution 10% بوفيدون اليود النشط

مكونات غير فعالة

حامض الستريك ، هيدروكسيد البوتاسيوم ، بولي إيثيلين جلايكول ، أكوا

تحذيرات

- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
- للاستخدام الخارجي فقط
- لا يأخذ عن طريق الفم

لا يستخدم

- في العيون
- إذا كان لديك حساسية من بوفيدون اليود أو أي مكونات أخرى في هذا المستحضر

احتياطات

- يسبب تهيجا خطيرا في العين
- ابق الحاوية مغلقة بإحكام
- في حالة الابتلاع: لا يسبب القيء. أعط كوبًا من الماء على الفور للشرب واتصل بالطبيب أو الذهاب لمركز الطبي على الفور
- في حالة دخول العينين: اشطفها بحذر لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة. استمر في الشطف

الاستعمال

يوضع على منطقة نظيفة

- ضع المحلول على الموقع الجراحي بعد تطبيق مقشر بوفيدون اليود
- البدء من موقع الجراحة متحركًا للخارج في دوائر متحدة المركز
- يترك دقيقتين على الأقل من وقت التجفيف قبل اللف
- قم بإزالة جميع الستائر السفلية المتسخة

معلومات أخرى

- حافظ على البرودة. حماية من أشعة الشمس
- يخزن في درجة حرارة تتراوح بين 20-25 درجة مئوية (68-77 درجة فهرنهايت).
- تجنب الحرارة الزائدة فوق 40 درجة مئوية
- للحصول على معلومات إضافية ، راجع صحيفة بيانات السلامة (SDS)

سيف كير للصناعات الطبية ذ م م

كيزاد مدينة خليفة الصناعية 8-18

ص. ب 133685 أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة



منتج صنع في الإمارات العربية المتحدة رقم إعادة الطلب PVP1001 : المحتوي: 500 مل

للحصول على معلومات المنتج أو التقنية ، اتصل ب Safecare Medical على

+971 2 506 7333 أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت على www.bensano.com